

Motifs de consultations aux urgences de la maternité :

- Contractions utérines (= utérus dur dans son ensemble, pendant 30 secondes à 1 minute)
 - avant 37 semaines d'aménorrhée (= 8 mois de grossesse) si contractions douloureuses et répétées (>10/j)
 - au-delà de 37 semaines d'aménorrhée, en cas de début de travail : contractions utérines rapprochées, régulières et douloureuses. Possibilité de prendre un bain ou une douche en l'absence d'autre signe anormal (ci-dessous)
- Ecoulement anormal par voie vaginale : pertes de sang ou de liquide, même sans contractions utérines
- Diminution des mouvements du bébé
- Fièvre au-delà de 38°C
- Prurit cutané = démangeaisons persistantes sans raison apparente, sur tout le corps mais en particulier sur l'abdomen et sur les membres, et provoquant des insomnies.
- Nausées ou vomissements en 2^{ème} partie de grossesse
- Hypertension artérielle qui peut se manifester par
 - Des maux de tête persistants (= céphalées)
 - Des œdèmes (= pieds/mains gonflés)
 - Des « mouches » devant les yeux (= phosphènes)
 - Des bourdonnements d'oreille (= acouphènes)
 - Une douleur permanente et importante en barre, sous la poitrine (= barre épigastrique)
- Traumatisme abdominal (coup sur le ventre)
- Enfin, une visite de contrôle est nécessaire lorsque la grossesse atteint son terme (9 mois pleins)

Motifs de consultation non urgente chez médecin traitant, sage-femme ou gynécologue :

- Mycose (pertes vaginales anormales) ou démangeaisons vulvaires
- Signes d'infection urinaire sans fièvre
- Autre infection sans fièvre importante (ORL, respiratoire= rhume, toux...)
- Œdèmes des membres inférieurs isolés (pieds gonflés)
- Fatigue, troubles du sommeil
- Souhait de déclenchement de convenance ou de confort
- Connaître l'ouverture, la dilatation du col
- Montrer des résultats de laboratoires (prise de sang...) sauf sur indication médicale
- Ne pas hésiter à consulter le médecin traitant pour tout autre problème ne concernant pas la grossesse

Ce qui peut arriver pendant la grossesse et qui ne nécessite pas obligatoirement de consultation :

- Contractions utérines irrégulières après 37 SA (= 8 mois de grossesse)
- ≈ 10 contractions utérines par jour entre 6 et 9 mois de grossesse
- Perte du bouchon muqueux
- Petit saignement pendant quelques heures après un examen vaginal en consultation ou après un rapport sexuel
- Douleurs musculaires (ou « ligamentaires ») : sur les côtés du ventre, sans contractions utérines. Ces douleurs sont généralement peu intenses et se calment avec le repos.
- Petite chute (sur les genoux ou les fesses) sans atteinte abdominale (du ventre)
- Connaître le sexe du fœtus